

FLORA DEL BAJÍO Y DE REGIONES ADYACENTES

Fascículo 169

febrero de 2011

DIPENTODONTACEAE*

Por María Eugenia Molina-Paniagua**,**

Instituto de Ecología, A.C.

Centro Regional del Bajío

Pátzcuaro, Michoacán

y

Francisco G. Lorea-Hernández

Instituto de Ecología, A.C.

Xalapa, Veracruz.

Árboles o arbustos hermafroditas o dioicos, perennifolios o caducifolios; hojas simples, alternas, pecioladas, estípulas pequeñas, caducas, venación pinnada; inflorescencia axilar o terminal, cimosa, tirsoide o umbelada; flores pequeñas, (4)5(7)-

* Referencias: Cronquist, A. An integrated system of classification of flowering plants. Columbia University Press. New York. 681 pp. 1981.

Ma, J. & B. Bartholomew. Dipentodontaceae. In: Wu, Z. & P. H. Raven. (eds.). Flora of China 11: 494-495. 2008.

Matthews, M. L. & P. K. Endress. Comparative floral structure and systematics of Celastrales (Celastraceae, Parnassiaceae, Lepidobotryaceae). Botanical Journal of the Linnean Society 149: 129-194. 2005.

Simmons, M. P. Celastraceae. In: Kubitzki, K. (ed.). The families and genera of vascular plants. VI. Flowering plants. Dicotyledons: Celastrales, Oxalidales, Rosales, Cornales, Ericales. Springer-Verlag. Berlin & Heidelberg. pp. 27-64. 2004.

Worberg, A., M. H. Alford., D. Quandt & T. Borsch. Huerteales sister to Brassicales plus Malvales, and newly circumscribed to include *Dipentodon*, *Gerrardina*, *Huertealea*, *Perrottetia* and *Tapiscia*. Taxon 58: 468-478. 2009.

Zhang, L. B. & M. P. Simmons. Phylogeny and delimitation of the Celastrales inferred from nuclear and plastid genes. Systematic Botany 31: 122-137. 2006.

** Se agradece a los doctores Ma. Hilda Flores, Fernando Chiang, Sergio Zamudio y Jerzy Rzedowski por sus importantes sugerencias para la integración de este trabajo. Se dan las gracias asimismo a la Biol. Paola Rodríguez Torres por la elaboración de la ilustración.

*** La primera autora agradece al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por la beca escolar núm. 239386.

meras; sépalos y pétalos indiferenciados o distintos; disco anular presente, intraes-taminal, carnoso, con o sin glándulas, (4)5(7)-lobado; estambres (4)5(7), alternos a los pétalos, filamentos libres, insertos en el borde del disco, anteras introrsas, biloculares, longitudinalmente dehiscentes; ovario súpero, con 3 lóculos imperfectos o dos lóculos, óvulos de placentación libre central o basal, estilo simple, estigma puntiforme o extendido y bilobulado; fruto capsular, con una semilla o abayado con 2 a 4 semillas; éstas con o sin arilo, endospermo presente pero delgado.

En esta familia están considerados dos géneros, *Perrottetia* y *Dipentodon*, con 16 especies aproximadamente, distribuidas en Asia tropical, Australia, Islas del Pacífico y América; en México sólo se encuentra el género *Perrottetia* con dos especies.

Perrottetia frecuentemente había sido tratado como miembro de Celastraceae, sin embargo, hay evidencia morfológica que lo excluyen de la misma. Entre los principales caracteres del género *Perrottetia* que lo separan de las celastráceas cuentan los pétalos que son parecidos a los sépalos, el gineceo que es completamente sincárpico y tiene los estigmas carinales largos con las hendiduras ventrales cerradas por una pequeña capa de epidermis, los óvulos que están rodeados por más de una capa de células, la presencia de mucílago celular en los tejidos florales, la pubescencia presente en todos los órganos florales, los frutos abayados y las semillas que parecen tener arilo (Matthews y Endress, 2005). Posteriormente Zhang y Simmons (2006) y Worberg et al. (2009), con base en datos moleculares, concluyeron que *Perrottetia* debe segregarse de las Celastraceae y estar incluido en la familia Dipentodontaceae.

PERROTTETIA* Kunth

Árboles o arbustos monoicos o dioicos, glabros o puberulentos; ramas algunas veces con lenticelas; hojas ovadas u oblongas, membranáceas, margen aserrado, denticulado, crenado o subentero, generalmente con domacios, éstos pequeños, abaxiales, en las axilas de las venas secundarias o a lo largo de las nervaduras medias, nervios secundarios conspicuos; inflorescencias axilares, cimosas, tirsoides, flores unisexuales, pentámeras o tetrámeras, prefloración valvar en cáliz y corola, cáliz normalmente más chico que los pétalos; pétalos pubescentes o glabros; disco anular, entero o lobado; estambres insertos en el margen del disco, anteras

* Referencia: Lundell, C. L. Neotropical species of the genus *Perrottetia* (Celastraceae). *Phytologia* 57: 231-238. 1985.

longitudinalmente dehiscentes; ovario con 2 lóculos, aunque aparentemente en la base parecen ser 4, semiinmerso en el disco; óvulos basales, erectos, 2 a (3)4 por lóculo, estilo simple, estigma bilobulado, los lóbulos extendidos a reflejos; frutos abayados, poco carnosos; semillas 2 a (3)4, subesferoides, con una sarcotesta.

Género con 15 especies distribuidas en América tropical, sureste de Asia, Islas Canarias, Australia y Hawai.

Las especies difieren sólo en pequeños caracteres, por lo cual se ha sugerido una amplia revisión. Una en la zona de estudio.


***Perrottetia ovata* Hemsl., Diag. Pl. Nov. Mexic. 1: 6. 1878.**

Árbol o arbusto dioico, glabro, de (2)4 a 6(8) m de alto; corteza interna blanquecina, lisa; ramas por lo general dispuestas ligeramente en zigzag; hojas alternas; peciolo de 0.7 a 0.9(1) cm de largo, láminas anchamente ovadas o elíptico-oblongas, de (7.5)8 a 12(17.5) cm de largo por (3)6 a 7(8.5) cm de ancho, ápice acuminado y caudado, base redondeada a anchamente cuneiforme, margen fuertemente serrulado, nervios secundarios 6 a 8 pares, domacios de 1 mm o menos de largo, en forma de bolsillos, estrechamente oblongos, paralelos al nervio central en las axilas de las venas laterales inferiores, especialmente cerca de la base de la hoja, nervadura terciaria reticulada; inflorescencia axilar, tirsoide, de 6 a 9 cm de largo por 4 a 7 cm de ancho, glabra o con pelos catenados rojizos o con tonos morados, pedúnculos de 2.5 a 3 cm de largo, pedicelos de 0.4 a 0.9 mm de largo; cáliz en forma de tubo anchamente obcónico, lóbulos triangulares, muy cortos, de 0.3 mm de largo por 0.2 mm de ancho; pétalos triangulares, glabros, de ca. 0.4(0.6) mm de largo por ca. 0.2(0.3) de ancho, margen dentado; flores estaminadas con 5(6 o 7) estambres, varias veces más largos que los pétalos, de 1.2 a 1.8 mm de largo, filamentos de 1 a 1.2 mm de largo, anteras subglobosas o elipsoides, de 0.2 a 0.6 mm de largo por 0.2 a 0.3 mm de ancho, pistilo vestigial, disco plano; flores pistiladas con estaminodios de filamentos muy cortos, disco anular, ovario ovoide, no confluyente con el disco, con 2 lóculos, (1 a 3)4 óvulos por lóculo, erectos; fruto abayado, subgloboso-globoso o deprimido, de 4 a 5 mm de largo por 3 a 4 mm de ancho, rojo; semillas (1 a 3)4, subglobosas, erectas.

Habita en el bosque mesófilo de montaña en el noreste de Querétaro, Alt. 850-1800 m. Florece de marzo a septiembre y con frutos de junio a julio.


Taxon que sólo se distribuye en México: S.L.P., Qro., Hgo., Pue., Ver. (tipo: *H. Galeotti* 7117 (K)), Oax.

Conforme a los datos registrados por los colectores, la especie es sobre todo abundante en cañadas húmedas, por lo que se considera que en tanto se mantenga más o menos conservada la vegetación cercana a los márgenes de los arroyos y ríos, la especie no se encontrará amenazada de extinción localmente.



Perrottetia ovata Hemsl. A. rama con hojas e inflorescencia; B. flor femenina mostrando los dos lóculos y el cáliz y la corola semejantes; C. flor masculina mostrando el gineceo infértil y el androceo; D. fruto; E. semillas. Ilustrado por Paola Rodríguez Torres.

Querétaro: 4 km al oriente de La Parada, límite con San Luis Potosí, municipio de Jalpan, *B. Servín 961* (IEB, MEXU); 4-5 km al oriente de La Parada, municipio de Jalpan, *B. Servín 260* (IEB, MEXU, XAL); 6 km al oriente de La Parada, municipio de Jalpan, *B. Servín 76* (IEB, MEXU); 3-4 km al oriente de San Isidro, La Parada, La Minita, municipio de Jalpan, *B. Servín 901* (IEB, MEXU); 6-7 km al S de La Parada, La Cercada, municipio de Jalpan, *B. Servín 1012* (ENCB, IEB, MEXU, XAL); La Cercada, 7 km al S de La Parada, municipio de Jalpan, *B. Servín 1157* (IEB, MEXU); 6 km al S del Lobo, municipio de Landa, *R. Fernández 4076* (ENCB, IEB, TEX); km 6 del Lobo a Agua Zarca, municipio de Landa, *E. Carranza 707* (ENCB, IEB, MEXU, MICH); 1.5 km al SE de La Yesca, municipio de Landa, *H. Rubio 1706* (IEB, MICH, TEX); 1 km al poniente del Humo, municipio de Jalpan, *H. Rubio 763* (IEB, MICH, TEX); 1 km al SE del Pemoche, municipio de Landa, *H. Rubio 795* (IEB, MEXU), *1725* (IEB); El Embocadero, 4 km al SW del Humo, El



Lobo, municipio de Landa, *H. Rubio 520* (ENCB, IEB, XAL); 4 km al N de Agua Zarca, sobre el camino a El Lobo, municipio de Landa, *J. Rzedowski 46376* (ENCB, IEB, MEXU); cerca de Neblinas, Agua Zarca, municipio de Landa, *J. Rzedowski 46410* (IEB, MEXU, MICH, TEX, XAL); 1.5 km al SE de Rincón de Piedra Blanca, municipio de Landa, *H. Rubio 1560* (IEB, XAL); El Naranjo, municipio de Landa, *F. Lorea 679* (IEB).

ÍNDICE ALFABÉTICO DE NOMBRES DE PLANTAS

Celastraceae, 2

Dipentodon, 2

Dipentodontaceae, 1, 2

Perrottetia, 2

P. ovata, 3, 4, 5

I

II

III

MUNICIPIOS DE GUANAJUATO MUNICIPIOS DE QUERÉTARO MUNICIPIOS DE MICHOACÁN

32 Abasolo
 43 Acámbaro
 30 Apaseo El Alto
 29 Apaseo El Grande
 7 Atarjea
 28 Celaya
 27 Comonfort
 45 Coroneo
 36 Cortazar
 21 Cuernavaca
 14 Doctor Mora
 11 Dolores Hidalgo
 10 Guanajuato
 33 Huanímaro
 22 Irapuato
 35 Jaral del Progreso
 44 Jerécuaro
 25 Juventino Rosas
 8 León
 19 Manuel Doblado
 38 Moroleón
 1 Ocampo
 31 Pénjamo
 23 Pueblo Nuevo
 17 Purísima del Rincón
 20 Romita
 24 Salamanca
 41 Salvatierra
 3 San Diego de la Unión
 2 San Felipe
 18 San Francisco del Rincón
 13 San José Iturbide
 4 San Luis de la Paz
 12 San Miguel de Allende
 16 Santa Catarina
 40 Santiago Maravatío
 9 Silao
 46 Tarandacuao
 42 Tarimoro
 15 Tierra Blanca
 39 Uriangato
 34 Valle de Santiago
 5 Victoria
 26 Villagrán
 6 Xichú
 37 Yuriria

18 Amealco
 1 Arroyo Seco
 11 Cadereyta
 9 Colón
 8 El Marqués
 12 Ezequiel Montes
 15 Huimilpan
 2 Jalpan
 3 Landa
 16 Pedro Escobedo
 4 Peñamiller
 5 Pinal de Amoles
 7 Querétaro
 6 San Joaquín
 17 San Juan del Río
 13 Tequisquiapan
 10 Tolimán
 14 Villa Corregidora

53 Acuitzio
 24 Álvaro Obregón
 9 Angamacutiro
 32 Angangueo
 36 Coeneo
 28 Contepec
 21 Copándaro de Galeana
 22 Cuitzeo
 40 Charo
 34 Cherán
 33 Chilchota
 19 Chucándiro
 6 Churintzio
 5 Ecuandureo
 27 Epitacio Huerta
 47 Erongarícuaro
 20 Huandacareo
 18 Huaniqueo
 51 Huiramba
 41 Indaparapeo
 29 Irímbo
 2 La Piedad
 50 Lagunillas
 26 Maravatío
 38 Morelia
 44 Nahuatzen
 3 Numanán
 10 Panindícuaro
 43 Paracho
 49 Pátzcuaro
 8 Penjamillo
 15 Purépero
 11 Puruándiro
 42 Queréndaro
 37 Quiroga
 23 Santa Ana Maya
 52 Santa Clara del Cobre
 30 Senguio
 4 Sixto Verduzco
 14 Tangancícuaro
 39 Tarímbaro
 46 Tingambato
 31 Tlalpujahua
 13 Tlazazalca
 48 Tzintzuntzan
 45 Uruapan
 16 Villa Jiménez
 17 Villa Morelos
 1 Yurécuaro
 35 Zacapu
 12 Zamora
 7 Zináparo
 25 Zinapécuaro

